

SIERRO	T. I	1	ALCONTAR	T. I	6
	T. II	8		T. II	10
	T. III	6		T. III	11
	T. IV	2		T. IV	0
	Otras	7		Otras	14
	Reconocidos	24		Reconocidos	40

Hemos visto casi igual número de enfermos en los seis restantes pueblos y no damos estadística de ellos por no haber podido registrarlos en nuestro libro registro.

Formas de tracoma en estos pueblos

Armuña	tipo superficial (benigno)
Tijola	» mixto (mediano)
Lúcar	» » »
Sierro	» infiltrativo (grave)
Oria	» superficial (benigno)
Alcóntar	» » »

De los demás pueblos Partaloa predomina por su tipo neoplásico infiltrativo de suma gravedad.

Lucainena de las Torres 31 de mayo de 1933.

El Oculista del Servicio Central.

DR. ENRIQUE MARÍN ENCISO

Dispensario Antitracomatoso de Allox		Úlcera corneal	1
Relación de enfermos nuevos, curas practicadas, intervenciones, en este Dispensario en los veinte primeros días del mes de la fecha.		Estafiloma total anterior	1
Tracoma incipiente	48	Dacriocistitis crónica	1
Tracoma de estado	46	Pterigiun	1
Tracoma cicatricial	32	Glaucoma secundario	1
Tracoma final	3	Nada ocular	1
		Orzuelo	1
		Catarata senil	4
		Ambliopia doble	2
		Miopía	1
		Presbicia	2
Total de tracomatosis	129	Total de no tracomatosis	22
		INTERVENCIONES	
Conjuntivitis aguda	3	Raspado	28
Conjuntivitis crónica	1	Entropión (procedimiento Marín Amat)	5
Queratitis parenquimatosa	1		
Blefar-conj. flictenular	1		