

Pensad bien que, el secreto para que sea respetada vuestra gestión, es actuar en todos los momentos como sanitarios a secas. Sin que ninguna influencia baja o empingorotada, filo ni fobia alguna, menoscabe ni tuerza vuestros juicios y decisiones que, han de resultar siempre desde todos los puntos de vista, pura y exclusivamente técnicas. Así venceréis, de otro modo será discutida vuestra conducta; de la incredulidad al desprestigio no hay más que un paso; acabareis perseguidos y la vida se os hará imposible.

Y hasta por hoy de consideraciones.

Cuantas ideas en bien de la Sanidad pública, en sus distintas ramas y funciones — médicos, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, practicantes, matronas—quieran comunicarnos, serán publicadas en este Boletín que, así cumplirá su más alto y principalísimo objeto. Procuraremos dar alientos y ensalzar toda obra en tal sentido meritoria, con el deseo grandísimo de poder llegar a dar *premios en metálico* a los de mérito sobresaliente, según hicimos ya en otras provincias.

De nuestros afanes y propósitos, no es posible adelantar programa y menos prometer ceñirnos a pauta elegida de antemano. En lo relacionado con la enfermedad y con la higiene sólo cabe actuar en *presente* y a tenor de lo que vaya sucediendo.

Repito mi saludo cordialísimo a todos y mi ofrecimiento y cooperación entusiastas, a prueba de luchas, dificultades y detiempo. Pero también recabo de todos, sin olvidar la poderosa palanca de la Prensa, su apoyo más decidido. Sin él habría de renunciar, por imposible, al logro de mis vivísimos anhelos.

Almería, agosto de 1932.

El Inspector Provincial de Sanidad.

ANTONIO MALLOU.

EL LABORATORIO Y EL DIAGNÓSTICO DE UNA ANGINA

- 1.º *Una angina aguda ¿es diftérica o fuso espirilar?*
- 2.º *Una ulceración antigua ¿es sífilítica, tuberculosa, micótica, cancerosa?*
- A. *Casos agudos: Condiciones y técnica de la recogida de productos.*

Toda angina puede ser de naturaleza diftérica, pura o asociada a otra infección. Las más benignas, igual que las más ulcerosas, pueden ser seguidas de parálisis diftéricas. Se someterá pues al diagnóstico del laboratorio toda angina, aún las más ligeras.

La precisión bacteriológica debe aportarse tan rápidamente como sea posible. Se deberá amenudo *improvisar una recogida de producto*, con ocasión de la primera visita al enfermo, mejor que esperar la del día siguiente, ni aguardar a que llegue un escobillón estéril pedido al laboratorio vecino. No se titubeará pues en utilizar un trozo de compresa estéril montado en la extremidad de una pinza, hasta podríamos servirnos de un estilete o en último extremo de una varilla de madera a uno de cuyos extremos se arrolla un poco de algodón, hasta sin esterilizar. Se tendrá cuidado de envolver para el transporte la