

positivos por los 3 métodos —B. W. (C. M. D.)—Kahn—M. K. R.—o sea una concordancia global de 97, 5 por 100.

La M. K. R. de Meinicke posee pues un gran valor y merece figurar entre los mejores métodos de floculación, tales como los de Kahn y de Müller.

El profesor Sr. Madsen, presidente de la Sección de Higiene de la Sociedad de Naciones, aprovechó la presencia en Copenhague de algunos expertos serólogos que habían participado en su mayoría en los trabajos de la Conferencia de 1928, para provocar una discusión sobre los progresos realizados en estos dos últimos años en el dominio del serodiagnóstico de la sífilis. Esta discusión fue precedida de un estudio en común de 26 sueros en los laboratorios del Instituto serológico del Estado danés; estos sueros los examinaron 6 serólogos: Hech (Praga), Kline (Cheveland-Ohio), Meinicke (Ambrock), Müller (Viena), Nörel (Copenhague), Debains (Paris).

Se estuvo conforme en que el pequeño número de muestras examinadas no permitía naturalmente ninguna conclusión definitiva, pero se admitió de una manera general que los métodos serológicos habían ganado en especificidad y en sensibilidad.

Conferencia de Montevideo.

Algunas semanas más tarde

tenía lugar la Conferencia de Montevideo en los locales del Instituto profiláctico de la sífilis dirigido por nuestro colega y amigo el Dr. Scaltritti.

Siete serólogos ejecutaron técnicas derivadas del Bordet-Wassermann, otros cuatro aplicaron diferentes procedimientos de floculación; Kahn, Müller, Prunell sus técnicas propias; Dussert-Jolland utilizó la Klarung's reaktion de Meinicke.

¿Qué nos enseñan los resultados obtenidos?

1.º *Técnicas derivadas del Bordet - Wassermann.* — Las técnicas del Bordet-Wassermann han realizado serios progresos.

Especificidad: Los procedimientos de Scaltritti-Cassiniga, Sordelli-Miravent, Wyler, han sido claramente específicos, con una superioridad de los dos primeros sobre el tercero.

Sensibilidad: La técnica Sordelli-Miravent es la que ha dado los resultados mejores y más claros (59 por 100 de positivos).

2.º *Métodos de floculación. Reacción de Kahn.* — Hagamos constar primeramente que el método de Kahn, alcanzó el mismo éxito que en Copenhague, confirmando así su valor indispensable, clasificándose brillantemente la primera; la reacción «Standard» fué más específica que la de Müller con un valor diagnóstico superior en las reaccio-